Инструкция по применению вагинального геля Лактагель

Регистрационный номер: ФСЗ 2010/08335 от 15.06.2020

Состав

В 1 тюбике содержится: молочная кислота 225 мг, гликоген, пропиленгликоль, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия лактат, вода.
pH 3,8

Во влагалище в естественных условиях встречаются бактерии различных групп, при этом в самых больших количествах обычно представлены лактобактерии. Лактобактерии, перерабатывая гликоген, поступающий из клеток эпителия влагалища, вырабатывают молочную кислоту, поддерживая тем самым низкий уровень pH во влагалище, что создает неблагоприятные условия для развития патогенных бактерий и грибков. Это естественный и очень эффективный механизм защиты от инфекций.
Если количество лактобактерий уменьшается и уровень pH поднимается, происходит размножение «плохих» бактерий. Это состояние называется бактериальным вагинозом (БВ). К основным симптомам, связанным с БВ, относятся: неприятный запах, аномальные выделения и влагалищный дискомфорт. БВ — это очень распространенное заболевание у женщин.

Факторы, способствующие развитию бактериального вагиноза:

- Продолжительная менструация
- Курсы антибиотиков
- Частое и чрезмерное использование средств интимной гигиены
- Незащищенный половой акт (сперма может изменять pH влагалища в щелочную сторону)
- Использование внутриматочной контрацепции (ВМК, который обычно называют спиралью).

Подробнее о роли спринцевания в развитии бактериального вагиноза

Нередко женщины при возникновении симптомов бактериального вагиноза самостоятельно прибегают к спринцеванию, связывая неприятный запах с недостаточной гигиеной. При этом спринцевание вызывает еще большее обострение бактериального вагиноза, поскольку при этом вымывается нормальная микрофлора, замещаясь условно-патогенными бактериями.

Что такое Лактагель? 341 38-07

Лактагель – гель, содержащий молочную кислоту и гликоген.
Молочная кислота способствует снижению pH влагалища (т.е. созданию более кислой среды).
Гликоген является питательной средой, необходимой для размножения лактобактерий.
Нормализуя (снижая) значения pH и создавая соответствующие условия для размножения лактобактерий, Лактагель восстанавливает естественную среду во влагалище и устраняет симптомы: обильные выделения, дискомфорт и неприятный запах.

Как использовать Лактагель?

Лечение бактериального вагиноза (БВ)	
Для эффективного облегчения симптомов бактериального вагиноза — обильных выделений, неприятного запаха, влагалищного дискомфорта	Применять 1 тюбик ежедневно в течение 7 дней
Поддержание нормальной микрофлоры и pH влагалища	
При признаках рецидива БВ, для восстановления нормальной микрофлоры и pH влагалища: • во время курса антибиотиков и/или противогрибковых препаратов • после менструации	Повторить курс, применяя 1 тюбик ежедневно в течение 7 дней

Лактагель выпускается в тюбиках для одноразового применения. Чтобы открыть тюбик, поверните колпачок и снимите его.

Полностью вставьте наконечник тюбика во влагалище. Сдавите стенки тюбика. Не прекращая сдавливать, удалите тюбик. После этого тюбик можно выбросить.

Лучше всего использовать Лактагель перед сном, так как некоторое количество геля может вытечь. Рекомендуется применять гигиенические прокладки для белья.

Применение во время беременности:

Лактагель можно применять во время беременности, однако при подозрении на наличие вагинальной инфекции во время беременности рекомендуется обратиться к врачу.

Особые указания:

Следует избегать применения Лактагеля во время попыток зачатия, так как низкие значения pH влагалища негативно сказываются на активности сперматозоидов.
Лактагель не следует применять в качестве средства контрацепции.
Лактагель не следует применять при наличии индивидуальной непереносимости к какому-либо из компонентов состава. Не использовать после истечения срока годности. Не использовать тюбик при нарушении его целостности. Хранить в недоступном для детей месте.
Не предназначено для детей.

Форма выпуска:

Одна упаковка содержит 7 тюбиков для одноразового применения по 5 мл каждый.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре.

Срок годности:

3 года.

Владелец регистрационного удостоверения:

ООО «Орион Фарма», Россия
119034, г.Москва, Сеченовский пер., дом 6, стр.3

Производитель:

«Рольф Куллгрен АБ», Швеция
Rolf Kullgren AB, Ågatan 4, 646 30 Gnesta, Sweden

Претензии потребителей направлять по адресу:

ООО «Орион Фарма»
119034, г.Москва, Сеченовский пер., дом 6, стр.3
тел.: (495) 363-50-73
тел./факс: (495) 363-50-74

Інструкція для застосування вагінального гелю Лактагель

Склад

1 тюбик містить:

кислота молочна 225 мг, глікоген, пропіленгліколь, гідроксипропілметилцелюлоза, натрію лактат, вода.

pH 3,8.

У піхві в природних умовах зустрічаються бактерії різних груп, при цьому в найбільших кількостях зазвичай представлені лактобактерії. Лактобактерії, перероблюючи глікоген, що надходить з клітин епітелію піхви, виробляють молочну кислоту, підтримуючи тим самим низький рівень pH у піхві, що створює несприятливі умови для розвитку патогенних бактерій і грибків. Це природний і дуже ефективний механізм захисту від інфекцій. Якщо кількість лактобактерій зменшується і рівень pH підвищується, відбувається розмноження «поганих» бактерій. Цей стан називається бактеріальним вагінозом (БВ). До основних симптомів, пов'язаних з БВ, відносяться: неприємний запах, аномальні виділення і вагінальний дискомфорт. БВ – досить поширене порушення мікрофлори піхви.

Чинники, що сприяють розвитку бактеріального вагінозу:

- тривала менструація
- курси терапії антибіотиками
- часте і надмірне застосування засобів інтимної гігієни
- незахищений статевий акт (сперма може змінювати pH середовища піхви в лужну сторону)
- використання внутрішньоматкового контрацептиву (ВМК, котрий зазвичай називають спіраллю).

Докладніше про роль спринцювання у розвитку бактеріального вагінозу

Нерідко жінки при виникненні симптомів бактеріального вагінозу самостійно вдаються до спринцювання, пов'язуючи неприємний запах з недостатньою гігієною. При цьому спринцювання викликає ще більше загострення бактеріального вагінозу, оскільки при спринцюванні вимивається нормальна мікрофлора, яка заміщується умовно-патогенними бактеріями.

Що таке Лактагель?

341 38-07

Лактагель – гель, що містить молочну кислоту і глікоген.

Молочна кислота сприяє зниженню pH піхви (тобто створенню більш кислого середовища).

Глікоген є живильним середовищем, необхідним для розмноження лактобактерій.

Нормалізуючи (знижуючи) значення pH і створюючи відповідні умови для розмноження лактобактерій, Лактагель відновлює природне середовище в піхві і усуває симптоми – рясні виділення, дискомфорт і неприємний запах.

Як використовувати Лактагель?

Застосування при бактеріальному вагінозі (БВ)	
Для ефективного полегшення симптомів бактеріального вагінозу – рясних виділень, неприємного запаху, вагінального дискомфорту	Застосовувати по 1 тюбику щоденно протягом 7 днів
Підтримка нормальної мікрофлори і pH піхви	
При ознаках рецидиву БВ, для відновлення нормальної мікрофлори і pH піхви: • під час курсу антибіотиків та/або протигрибкових препаратів • в період менструації	Повторити курс, застосовуючи по 1 тюбику щоденно протягом 7 днів

Лактагель випускається у тюбиках для одноразового застосування. Щоб відкрити тюбик поверніть ковпачок і зніміть його.

Повністю введіть наконечник тюбика в піхву. Здавіть стінки тюбика. Не припиняючи здавлювати, видаліть тюбик. Після цього тюбик можна викинути.

Найкраще використовувати Лактагель перед сном, оскільки деяка кількість гелю може витекти. Рекомендується застосовувати гігієнічні прокладки для білизни.

Застосування у період вагітності та годування груддю

Лактагель можна застосовувати у період вагітності та годування груддю, проте при підозрі на наявність вагінальної інфекції під час вагітності рекомендується звернутися до лікаря.

Особливі вказівки

Слід уникати застосування Лактагелю під час спроб зачаття, оскільки низькі значення pH піхви негативно позначаються на активності сперматозоїдів.

Лактагель не слід застосовувати як засіб контрацепції.

Лактагель не слід застосовувати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів, що входять до складу гелю.

Не використовувати після закінчення терміну придатності!

Не використовувати тюбик при порушенні його цілісності.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Не застосовувати дітям.

Форма випуску

Одна упаковка містить 7 тюбиків для одноразового застосування по 5 мл кожен.

Умови зберігання

Зберігати при кімнатній температурі.

Термін придатності

3 роки.

Виробник

Rolf Kullgren AB/Рольф Кульгрен АБ, Огатан 4, 64630 Гнеста, Швеція.

Імпортери: СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД», Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-А, тел.: (044) 490 5310; ТОВ «БаДМ», 49040, Україна, м. Дніпро, вул. Панікахи, 2, тел.: (056) 747 0110; ТОВ «Вента ЛТД», 49000, Україна, м. Дніпро, Селянський узвіз, 3-А, тел./факс: (056) 370 3500.

Претензії від споживачів приймає:
ТОВ «ОРІОН ФАРМА ЮКРЕЙН», 03067, м. Київ, проспект Перемоги, 53. Тел.:+380 (44) 230 4721.

A-0045438-01-5

Sameer Hatiskar
Digitally signed by Sameer Hatiskar
DN: cn=Sameer Hatiskar, o=Orion Corporation, ou=Packaging Technology, email=sameer.hatiskar@orion.fi, c=IN
Reason: Approved Print Proof
Date: 2017.10.19 04:57:17 +07'30'
Adobe Acrobat version: 2017.009.20080