


ФЛУТАМИД

Таблетки по 250 мг



ORION

ЕВРОПА
ДОВЕРЯЕТ КАЧЕСТВУ



ФЛУТАМИД – антиандроген без побочных эффектов стероидов

- Блокирует действие надпочечниковых андрогенов
- Блокирует андрогенные рецепторы (в предстательной железе и метастатических очагах)
- Эффективен в монотерапии без увеличения дозы³
- Сохраняет либидо и сексуальную потенцию
- Отсутствие риска сердечно-сосудистых осложнений
- Возможность применения при сахарном диабете¹
- Улучшает качество и продолжительность жизни¹
- Финское качество препарата и собственная субстанция
- Отлично переносится пациентами

«Золотым стандартом» максимальной андрогенной блокады считается сегодня комбинация кастрации (хирургической или медикаментозной) и нестероидного антиандрогена²

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ФЛУТАМИД (FLUTAMIDE) таблетки по 250 мг

Показания

Лечение прогрессирующего рака простаты в качестве монотерапии (с или без орхиэктомии) или в комбинации с агонистами лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона ЛГРГ (LHRH) у больных, которым раньше не назначали никакого лечения, которые не реагируют или в которых развилась резистентность к гормональной терапии или ее непереносимость. В комбинированной терапии - как одно из средств для лечения локально ограниченного рака простаты B2-C2 (T2b-T4), для уменьшения объема опухоли, усиления контроля над опухолью и увеличения периода между обострениями болезни.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к флутамиду или вспомогательным веществам, которые входят в состав препарата, тяжелая печеночная недостаточность.

Способ применения и дозы

Для первородного применения.

Препарат применяют как монотерапию, так и в комбинации с ЛГРГ по одной таблетке (250 мг) 3 раза в сутки с восмичасовым интервалом. Общая суточная доза для взрослых составляет 750 мг. В составе комбинированной терапии с агонистами ЛГРГ прием Флутамида начинают за 3 дня до начала терапии агонистами ЛГРГ.

Побочные реакции

Монотерапия: Распространенные: бессонница, диарея, тошнота, рвота, повышение аппетита, гинекомастия, нагрубание молочных желез, галакторея, утомляемость. Нераспространенные: опоясывающий герпес, отек, экхимоз, лимфедема, волчаночно-нодулярный синдром, депрессия, тревога, головокружение, затуманивание зрения, диспnoя, боль в желудке, язвообразная боль, изжога, запор, гепатит, анорексия, жаждя, зуд, снижение либido, уменьшение спермообразования, головная боль, лихорадка, жаждя, боль за грудиной, слабость. Единичные случаи: новообразование в грудных железах у мужчин, кашель, фоточувствительность. В составе комбинированной терапии: Наиболее распространенные: снижение либido, импотенция, приливы крови. Очень распространенные: диарея, тошнота, рвота. Нераспространенные: анемия, лейкопения, отек, тромбоцитопения, депрессия, тревога, беспокойство, сонливость, спутанность сознания, нервозность, невроз, боль в брюшной полости, желтуха, анорексия, сыпь, артрит, миалгия, дизурия, изменение частоты мочеиспускания, артериальная гипертензия, гинекомастия. Единичные случаи: гемолитическая анемия, макроцитарная анемия, меттемоглобинемия, сульфемоглобинемия, гиперплакмия, обострение сахарного диабета, интерстициальное поражение легких, холестатическая желтуха, печеночная энцефалопатия, некроз печени, случаи тяжелого повреждения печени с летальным концом, фоточувствительность, эритема, язвы, буллезная сыпь, эпидермальный некроз, изменение цвета мочи до янтарного и желто-зеленого.

Orion Corporation, ORION PHARMA
P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo, Finland
Tel/Fax +358 10 426-38-15



Представительство в Киеве
04116, Киев, ул. Шолуденко, 3, офис 309
тел.: +38 044 230-47-21
факс: +38 044 230-47-22
э. почта: root@opi.kiev.ua
www.orionpharma.com.ua

Качество жизни пациентов²

	Флутамид	Ципротерона ацетат	Дизтилстилбэстрол
Отсутствие риска возникновения осложнений со стороны ССС	●	✗	✗
Гинекомастия	●	✗	✗
Использование при сахарном диабете	●	✗	✗
Сохранение либido и сексуальной потенции	●	✗	✗
Возможность приёма алкоголя	●	✗	●
Чистое антиандрогенное действие	●	✗	✗

● — благоприятное действие (или отсутствие влияния, если речь идет о побочном действии)

✗ — неблагоприятное воздействие (или присутствие, если речь идет о побочном действии)

Фармакологические свойства

Флутамид — антиандрогенный препарат нестероидной структуры. Флутамид и его метаболиты не обладают агонистическими или антагонистическими свойствами в отношении рецепторов глюкокортикоидов, минералкортикоидов и эстрогенов. Флутамид блокирует андрогенные рецепторы клеток-мишеней в предстательной железе, гипоталамусе и гипофизе и ингибирует биологические эффекты эндогенных андрогенов.

Фармацевтические характеристики

Срок годности: 3 года

Условия хранения: хранить при комнатной температуре (15–25°C).

Упаковка: 21 таблетка в блистере и 4 блистера в картонной упаковке.

Условия отпуска: по рецепту врача.

Регистрационный номер: UA/0488/01/01

Для более подробной информации смотри инструкцию по медицинскому применению

Литература:

1. Labrie F. et al. //Combination therapy with flutamide and castration in advanced prostate cancer: a marked improvement in response and survival.// J Steroid Biochem Mol Biol. 1985; 23(5B): 833-841.
2. Артищук О.Н., Артищук В.Н. //Максимальная андрогенная блокада у лікуванні дисемінованого раку передміхурової залози.//Новости медицины и фармации №3 (131) 2003
3. Systematic review and meta-analysis of monotherapy compared with combined androgen blockade for patients with advanced prostate carcinoma/David J. Samson et al //J CANCER/V95/#2 pp.361-376/2002

Качество
создает успех

Мы создаем Качество

Великолепное Качество подобно алмазу –
драгоценно и достойно стремления к нему,
и недостижимо без упорного труда.

Для нас в Орионе, Качество – ежедневная забота.
Мы и наши решения основаны на нем. Мы построили серьезную основу для Качества в деятельности наших команд и быстрого и правильного выполнения процессов.

Мы в Орионе полагаемся на наше Качество, также как наши Партнеры и Клиенты.

Качество – наиболее значимо